ANTIBIOEST

Inspiré d'un document réalisé par l'EMA de Corbeil-Essonnes

FICHE MÉMO

BON USAGE DES FLUOROQUINOLONES (FQ) EN SOINS PRIMAIRES

MISE AU POINT SUR LE BON USAGE DES FLUOROQUINOLONES
Actualisation 2025 de la SPILF et du GPIP - ScienceDirect

EN SECONDE INTENTION UNIQUEMENT

Rappel : recommandations SPILF Allergie aux antibiotiques - Actualités - Documents - spilf - infectiologie

INFECTIONS ORL
Uniquement sinusites frontales, sphénoïdales et ethmoïdales


INFECTIONS DIGESTIVES
Diarrhées aiguës bactériennes


INFECTIONS RESPIRATOIRES BASSES
Pneumonies aiguës communautaires non graves, exacerbations de BPCO

CYSTITE GRAVIDIQUE
Uniquement en cas de résistance ou d'échec aux autres antibiotiques possibles

En 1ère intention, traitement probabiliste des


Pyélonéphrites aiguës simples





Infections urinaires masculines fébriles (prostatites)

Toujours en l'absence d'exposition aux fluoroquinolone dans les 6 derniers mois



Orchi-épididymites sans facteur de risque d'IST

AUCUNE INDICATION DANS LES CYSTITES DE L'HOMME ET DE LA FEMME NON ENCEINTE

AUTRES INDICATIONS

sur AVIS INFECTIOLOGUE

Prise en charge spécialisée et très souvent hospitalière

CONTRE-INDICATIONS

- Allergie/hypersensibilité
- Antécédents d'effets indésirables tendineux suite à la prise de FQ (tendinopathie ou rupture tendineuse)
- Troubles neurologiques (épilepsie)
- Allaitement
- Troubles du rythme cardiaque et allongement du QT
- Enfants ou adolescents

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Insuffisance rénale
- Grossesse (cf. CRAT)
- Personne âgée
- Traitement par AVK
- Antécédents cardiaques (anévrisme, dissection aortique, valvulopathies)

EFFETS INDÉSIRABLES



Effets musculo-squelettiques
Tendinopathie et rupture tendineuse

Effets cardio vasculaires
Allongement de l'intervalle QT et dissection aortique

Effets neurologiques
Neuropathies périphériques, convulsions et risque confusiogène

Impact sur le microbiote
Infections à *Clostridioïdes difficile* et résistance

Photo-sensibilisation

INFORMER LE PATIENT DES SIGNES D'ALERTE

Déclaration de tout effet secondaire au centre de pharmacovigilance et au CRPV de votre territoire

Consultation médicale rapide en cas d'effets indésirables

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Plus de risques d'effets indésirables chez les patients âgés, les insuffisants rénaux et en cas d'associations avec les corticoïdes (à éviter).
Précaution sur l'utilisation concomitante de topique digestif, sucralfate, sel de fer et calcium (dont produits laitiers). Pas d'exposition au soleil + protection solaire indice 50.